

Hinweise zur Fischkrankheitsprävention bei fischereilichen Untersuchungen

Bei fischereilichen Untersuchungen in unterschiedlichen Gewässern besteht generell die Gefahr der Verbreitung von Fischseuchen-, Fischkrankheits- und Krebspesterregern über die Arbeitsgeräte und Schutzkleidung! Die Befischungsteams sollten daher alle geeigneten Präventionsmaßnahmen und Verhaltensweisen zur Verhinderung einer Weiterverbreitung von Krankheitserregern befolgen.

- Es ist eine den seuchenhygienischen Erfordernissen entsprechende Tourenplanung vorzunehmen. Dies bedeutet: zuerst kleine, dann größere Fließgewässer zu befischen, bei mehreren Probestellen in einem Gewässer eine Bearbeitungsreihenfolge vom Oberlauf zum Unterlauf hin einzuhalten und Gewässer mit Edelkrebsvorkommen zuerst zu untersuchen.
- Werden verschiedene Gewässern befischt, ist eine Reinigung und Desinfektion der Ausrüstung bei einem Gewässerwechsel erforderlich. Ausnahme: wenn ein Wechsel von einem kleinen Gewässer (Zulauf) in das nächst größere (Vorfluter) erfolgt und dabei die nachfolgende Messstelle stromab des Zusammenflusses liegt.
- Vor einer Desinfektion ist eine gründliche Reinigung erforderlich. Daher empfiehlt sich die Durchführung an einem festen Stützpunkt, wo Leitungswasser und saubere Hilfsmittel (Wannen, Bürsten) zu Verfügung stehen.
- Erfolgt ein Gewässerwechsel innerhalb eines Tages, kann eine Reinigung und Desinfektion auch unterwegs durchgeführt werden. Dafür ist eine Gebrauchslösung in auslaufsicheren Behältern mitzuführen. Nach Beendigung der Tour ist zusätzlich eine gründliche Reinigung und Desinfektion am Stützpunkt erforderlich.
- Vor und nach Befischungen im Bereich von Aquakultur- und Teichanlagen ist ebenfalls eine gründliche Reinigung und Desinfektion der Ausrüstung notwendig.
- Sind bei einer Befischung Anzeichen von Krankheiten oder Fischsterben zu bemerken, ist nachfolgend eine sorgfältige Reinigung und Desinfektion der Ausrüstung am Stützpunkt erforderlich. Die Anzeigepflicht von Tierseuchen nach §4 TierGesG ist ggf. zu beachten. Auskünfte zur aktuellen Tierseuchenlage in Deutschland gibt das Tierseucheninformationssystem (www.tsis.fli.bund.de).
- Die Desinfektion ist mit geeigneten und DVG-gelisteten Desinfektionsmitteln durchzuführen. Eine aktuelle Liste ist bei der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft einzusehen (www.dvg.net/index.php?id=1449). Die Desinfektionsmittel sind frei verkäuflich (z. B. Landhandel oder Hersteller). Die Gefahren- und Sicherheitshinweise sind zu beachten.
- Desinfektionsmöglichkeiten (je nach Wirkstoff und Angaben des Herstellers):
 - Tauchdesinfektion in Wannen, geeignet für Stiefel, Wathosen, Kescher, Kathoden, Netze, Gummihandschuhe, Eimer u. ä.
 - Sprühdesinfektion mit Drucksprühgeräten, geeignet für Wannen, Transportbehälter, Boote u. ä.
- Die Gebrauchsanweisung und Einwirkzeiten des jeweiligen Desinfektionsmittels sowie die Materialverträglichkeit (Korrosionsgefahr) sind zu beachten.
- Nach erfolgter Desinfektion sind die Ausrüstungsgegenstände möglichst mit klarem Leitungswasser abzuspülen.