

Überblick über die Biologie der kommensalen Nager

Name	Hausmaus <i>Mus musculus</i>	Wanderratte <i>Rattus norvegicus</i>	Hausratte <i>Rattus rattus</i>
Familie	Langschwanzmaus <i>Muridae</i>	Langschwanzmaus <i>Muridae</i>	Langschwanzmaus <i>Muridae</i>
Lebensablauf	Erwachsen: mit 3-4 Wochen Geschlechtsreife: mit 2-4 Monaten Lebensdauer: in Menschenobhut ca. 2 Jahre	Erwachsen: mit 3-4 Wochen Geschlechtsreife: mit 3-4 Monaten Lebensdauer: 1-3 Jahre	Erwachsen: mit 3-4 Wochen Geschlechtsreife: mit 2-3 Monaten Lebensdauer: mehrere Jahre
Nahrung	Allesfresser Bevorzugt kohlenhydratreiche, pflanzliche Nahrung, besonders Sämereien und Körner Geringer Wasserbedarf	Allesfresser Getreide, Sämereien, Nüsse, Süßigkeiten, Lebensmittel, Stoffe tierischer Herkunft, tötet gelegentlich kleine Tiere Kann sich zum Nahrungsspezialisten entwickeln.	Allesfresser Bevorzugt Früchte, Getreide, Sämereien, Nüsse, Kartoffeln und andere saftige Lebensmittel Kann sich zum Nahrungsspezialisten entwickeln.
Lebensweise und Lebensraum	Je nach Unterart und Verbreitung überwiegend oder ausschließlich in Gebäuden bis ständig im Freiland lebend Guter Kletterer Lebt in Familienverbänden Überwiegend nachtaktiv; geringe Aktionsradien in der Regel 10-12 m vom Nest; nagt häufig kleinere Nahrungsmengen Weltweit verbreitet	Bodenlebend; mit unterirdischen Bauen, im Freiland; Kanalisation und in Gebäuden Sehr anpassungsfähig, guter Schwimmer und Kletterer Lebt in Rudeln Vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv; zielgerichtete Nahrungssuche; hohes Lernvermögen Weltweit verbreiteter Kommensale	Wenig Bodenkontakt, bevorzugt hochgelegene Verbergeorte aber auch in Erdbauten Hervorragender Kletterer, kletternd in Bäumen und Gebäuden Individuenreiche Kolonien Vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv, weniger zielgerichtete ständig wiederkehrende Nahrungssuche an bevorzugten Stellen; untereinander verträglicher als <i>R. norvegicus</i> Weltweit verbreitet
Gebäude	Können weltweit ganzjährig in Gebäuden vorkommen (<i>Mus musculus domesticus</i>).	Können weltweit ganzjährig in Gebäuden vorkommen. Besonders am Boden, Kellern oder in Bodenbereichen.	Können weltweit ganzjährig in Gebäuden vorkommen. Bevorzugen hochgelegene Gebäudeteile.