Rapstracht-Monitoring			
Fragebogen bei vermuteten Schädigungen der Bienenvölker			
Imker	Name	Straße	PLZ Wohnort
	Telefon	Fax	E-mail
Anzahl Bienenvölker insgesamt			
Standort	Bundesland	Landkreis	nächste Ortschaft
	Dauerstandort		
	Wanderstandort		
	Zeitpunkt der Aufstellung vorheriger Standort		
	vorherige Tracht		
Rapsfeld	Größe der Fläche		
	weitere Flächen im Umkreis von 2 km		
	Raps-Sorte		
	Rapsentwicklung	☐ sehr gut ☐ mittel ☐ schlecht	
	seit wieviel Jahren an diesem Standort		
	seit wieviel Jahren Rapstracht-Nutzung		
	<small>weitere Fragen siehe unten „Landwirt“</small>		
Bienenvölker	Anzahl		
	Aufstellung		
	Was ist vor den Fluglöchern (Gras, Ackerboden, etc.) ?		
	Beuten	Typ	Material
	Anzahl Waben	Brutraum	Honigraum
Versorgung	Witterung	☐ sehr gut ☐ mittel ☐ schlecht	
	Nektarversorgung	☐ sehr gut ☐ mittel ☐ schlecht	
	Pollenversorgung	☐ sehr gut ☐ mittel ☐ schlecht	
	Zeitpunkt der letzten Futtermenge		

Volksentwicklung	vor der Rapstracht	☐ sehr gut	☐ mittel	☐ schlecht
	in der Rapstracht	☐ sehr gut	☐ mittel	☐ schlecht
	Schwarmneigung	☐ stark	☐ mittel	☐ schwach
	Honigertrag	kg		
		☐ geschätzt	☐ gewogen	
Bienengesundheit	vor der Rapstracht	☐ sehr gut	☐ mittel	☐ schlecht
	in der Rapstracht	☐ sehr gut	☐ mittel	☐ schlecht
	Varroazid-Anwendung			
	Varroamittel			
	Zeitpunkt			
	Varroen im Vorjahr	☐ viel	☐ mittel	☐ wenig
	weitere Behandlungsmaßnahmen			
beobachtete Symptome Beschreibung der Bienenschädigung				
Auffälligkeiten an den Bienen				
z.B. tote Bienen tote Bienen mit Pollenhöschen schwarze Bienen Krabblers zitternde Bewegungen taumelnde Bewegungen „apathisches Verhalten“				
Auffälligkeiten an der Brut				
z.B. verzögerte Brutentwicklung verfärbte Larven/Puppen schwarze Larven/Puppen nicht vollentwickelte Larven/Puppen stehengebliebene Zellen herausgeräumte Brut				
weitere Auffälligkeiten				

Fragen an den Landwirt			
Rapsfeld	Größe der Fläche		
	weitere Flächen im Umkreis von 2 km		
	Raps-Sorte		
	Rapsentwicklung	☐ sehr gut ☐ mittel ☐ schlecht	
Pflanzenschutzmittel – Anwendung			
Anwendung von Insektizid	Produkt	vor der Blüte	in die Blüte
Fungizid			
Herbizid			
Saatgutbeize			
	Zeitpunkt der Spritzung	tagsüber	abends
	weitere Behandlungen auf benachbarten Kulturen		
	vorherige Kultur auf der Fläche		
	Beizung der vorherigen Kultur		